ENGLISH

Device description

Description

The Fassier-Duval Telescoping IM System is a self-extending rod for use in fixation of long bone fractures. The design of the nail includes a female component (which is attached to the proximal cortex) and a male component (which is attached at the distal epiphysis). Anchorage of the components is achieved through the use of locking screws. Additional components are used to facilitate insertion and extraction. Instrumentation is provided to ensure fixation with Locking Pins or Locking Pegs.

The nail has a built-in fixation that allows for extension of its length as the bone structures heal and normal patient growth occurs.

The nail is manufactured in medical grade Stainless Steel (316L, ASTM 138). It is available in five diameters: 3.2, 4.0, 4.8, 5.6 and 6.4 mm, up to 420 mm in length.

Intended Use/Purpose

The Fassier-Duval Telescoping IM System is intended as a temporary implant to aid in the alignment, stabilization, fixation, and healing of long bone fractures, osteotomies, non-unions and malunions, and to prevent further bone axis in the femur, tibia, and humerus in pediatric patients (2 to 18 years) suffering from Osteogenesis Imperfecta and other pediatric bone diseases.

Indications For Use

The system is indicated for pediatric patients with Osteogenesis Imperfecta or other bone diseases to aid in the alignment, stabilization, fixation, and healing of the following conditions in the femur, tibia, and humerus:

- Long diaphysis fractures.
- Osteotomies.
- Malunions and non-unions.

Intended Users

Note: The device is intended for professional use only

The Fassier-Duval Telescoping IM System are pediatric orthopedic surgeons and adult orthopedic surgeons.

Contraindications

Do not use in any situation that is not described in the Intended Use section of this insert.

Device should not be used in patients with:

- Active or latent infection or suspected latent inflammation in or about the affected area.
- Severe osteopenia and/or osteoporosis, insufficient quantity or quantity of bone/soft tissue, or in the presence of marked or rapid bone absorption, metabolic bone disease, cancer, or any other tumor, like conditions that the bone will not support the implant.
- Compromised vascularity inhibiting adequate blood supply to the operative site.
- Material sensitivity documented or suspected.
- Sepsis.
- Patients with abnormal neurological or mental conditions that compromise their ability to follow a post-operative regimen.
- Other medical or surgical conditions which would preclude the potential benefits of this device.
- Surgeons should warn patients about these contraindications and limitations when appropriate.

Disclosure of Residual Risks

While complications and adverse effects vary depending on the type of orthopedic surgery and while mitigations are implemented to reduce these risks as far as possible, some residual risks, associated with this system, can arise during and following surgery. These residual risks include adverse effects that are important considerations for metallic internal fixation devices. These risks and general surgical risks should be explained to the patient prior to surgery. The residual risks are listed in the sections below for Adverse Effects and Warnings.

Adverse Effects

The risks associated with this device are the same as with any metallic internal fixation device.

These include, but are not limited to the following:

- Pain, discomfort or abnormal sensations due to the presence of the device.
- Postoperative bone fracture and pain.
- Unrecognized joint penetration.
- Metal sensitivity and/or allergic reaction to a foreign body
- Bone resorption due to stress shielding.
- Limb shortening, residual deformity, nonunion or malunion.
- Infection, both deep and superficial.
- Nerve damage due to the surgical trauma.
- Possible neovascular injury.
- Inadequate healing.
- Necrosis of bone.
- Irritation or inflammation of surrounding soft tissue or skin over implant if coverage is insufficient.
- Bony formation around implant making removal difficult or impossible.
- Possible blood incubation or wound healing problems.
- Cessation of growth of the operated portion of bone.
- Migration resulting in injury to soft tissue and unrecognized joint penetration.
- It may be necessary to perform additional surgery in order to correct adverse effects or reactions which may not be related to the actual system.
- Corrosion of implants
- Hammertoe

Warnings

- Device breakage or damage can occur when implant is subjected to increased loading associated with delayed union, non-union, or incomplete healing. Proper consolidation should be observed prior to full weight bearing.
- Contouring or bending of an implant may reduce its fatigue strength and cause failure under load.
- OrthoPediatrics Canada advises against any modification of the manufacturer's component with any OrthoPediatrics Canada component. Any such use will negate the responsibility of OrthoPediatrics Canada for the performance of the resulting mix.
- Implant use single-use only. Reuse may lead to Single Use Device (SUD) that cannot be cleaned with human blood or tissue should not be re-used, reprocessed, or re-sterilized and should be either returned to the manufacturer or disposed of properly. Reusing implants may lead to contamination and increase the risk of infection to humans.
- Implants should never be reimplanted. Even if they appear undamaged, the device may have small defects or internal stresses that could lead to implant failure or compromise its performance.
- Correct implant handling is extremely important. Avoid contouring of metallic implants. Discard all damaged or mishandled implants or return them to the manufacturer for proper disposal.
- Selection of the largest diameter that is appropriate for the medullary canal of the host bone as well as proper positioning and insertion of the implant are crucial to mitigate the risk of implant failure.
- Failure to use larger size possible compromises the potential risk for the patient of a second surgical procedure. Implant removal should be followed by adequate postoperative management to avoid re-fracture or recurrent deformity.
- Care should be taken not to cut through surgical gloves when handling any sharp-edged implants and instruments, and to take into account the risk of infection if cut occurs.
- The surgeon should be aware, and the patient informed of the following information and limitations:
  - Compliance of the patient may affect the results of the surgery.
  - Patients should be warned to avoid any sudden change in position, strenuous activity, or falls. To achieve a successful union, the patient should not be exposed to mechanical vibrations, which may interfere in extreme, chronic, and many instances of the device. The patient should be warned of this possibility and instructed to restrict physical activities especially those causing any type of mechanical stress on the area that is being secured by the system. The patient should avoid any type of sport activities or strenuous work during the postoperative or post implant removal healing period.
  - complications and/or failure are more likely in the case of:
    - Physically active patients
    - Debilitated patients or patients unable to follow instruction or use weight supporting devices.
    - Patients that suddenly change position, fall, or are exposed to mechanical vibrations.

⚠ MRI Safety Information for Fassier-Duval Telescoping IM System:

In non-clinical testing, the Fassier-Duval Telescopic IM System implants were determined to be MR-Conditional. A patient with this device can be safely scanned immediately after placement under the following conditions:

Static Magnetic Field Strength (B0)	1.5 T and 3 T
Maximum Spatial Field Gradient	3,000 G/cm (30 gauss/cm) or less
RF Excitation	Circularly Polarized (CP)
RF Transmit Coil Type	Body Coil: See scan region limitations below
	Local Coils: Head transmit-receive coil, no restrictions on local transmit-receive coils that the device is not within
Operating Mode	Normal Operating Mode
Maximum Whole Body SAR	See details below
Maximum Head SAR	3.2 W/kg (Normal Operating Mode)
Anatomical Assurance Landmarks	< 50 cm from center of bone that device is implanted in
1.5 T SAR and Scan Durations	1 W/kg whole body average SAR for 10 minutes of continuous RF (a sequence or back-to-back series' can without breaks) with a 20-minute cooling period between scans for one hour of scanning
	Only use for local transmit-receive coils that device is not within
1.5 T SAR scanning unregarded	2 W/kg whole body average SAR for 60 minutes of continuous RF. (a sequence or back-to-back series' can without breaks)
3 T SAR and Scan Durations	The presence of this implant may produce an image artifact. Optimization of MR imaging parameters to compensate for the presence of this device may be necessary.
Image Artifact	

- The presence of other implants or the health state of the patient may require modification of the MR conditions.
- Information about a specific parameters not listed in the table above is not available.

Safety Benefits and Performance Characteristics

The FD Rods help reduce complications such as refracture and implant migration, compared to traditional IM rods in skeletally immature patients with osteogenesis imperfecta (OI) or other bone Diseases. Additionally, they help lower the need for reoperation and revision surgeries, leading to improved safety and better overall patient outcomes.

The FD Rods improve axial, torsional, and bending rates in skeletally immature OI patients or other bone diseases compared to traditional IM rods. Additionally, the FD System offers improvements in overall motor functions, range of motion, ambulation, pain and discomfort, and Pediatric Outcomes Data Collection Instrument (PODCI) scores. These benefits may lead to fewer surgeries and better long-term outcomes for pediatric patients. The performance characteristics of the implants has been determined to ensure the devices will fulfill their intended purpose during their intended lifetime. Detailed information about the device's performance characteristics can be found in the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) document. Please refer to the SSCP for comprehensive details about the device's performance and expected clinical outcomes. The instruments associated with the system are primarily designed to assist with the correct alignment, sizing, implantation, and explantation of the implant.

For SSCP please visit our website for patients at www.pegamedical.com/fm-patients and EUDAMED database.

Follow-up Information

Follow-up care is an important component of the treatment process following the implantation of the Fassier-Duval Telescopic IM System. Regular monitoring is necessary to access the device performance, to detect any potential issues early, and to ensure the patient's recovery is on track. The frequency and duration of follow-up visits should be determined by the treating surgeon, taking into account the individual patient's condition, age, and healing progress.

During follow-up visits, healthcare professionals should monitor potential complications. It is important to ensure that the implant remains in the correct position as the patient's skeleton grows. Although the system is designed to accommodate skeletal growth and maintain fracture stability, ongoing evaluation is essential to minimize the risk of complications and optimize the treatment outcomes.

The decision regarding the timing and extent of follow-up care is at the surgeon's discretion, based on clinical judgment and the specific needs of the patient.

Surgical Technique

Standard surgical technique for the placement of the intramedullary nails is recommended. Pre-operative procedures, knowledge of applicable surgical techniques, proper patient selection and correct implant placement are all equally important for the successful use of this implant. The surgical technique manual details every step and should be carefully followed.

Instrumentation is available to facilitate implantation and removal of the device. Therefore, this device can be used in combination with its surgical instrumentation (see below for details).

The Surgical Technique manual is available on the OrthoPediatrics Canada ULC website with the required language translations, if applicable. For more details, visit https://www.pegamedical.com/fm-users.

Device Lifetime and Retrieval

Removal or explantation of the implant is recommended subsequent to normal follow-up after the bone has consolidated, and either the deformity correction has been achieved or full extension of the Fassier-Duval is observed. Routine removal of internal fixation devices may reduce the occurrence of symptomatic complications of implant breakage, implant loosening and implant related pain. In addition, if removal is favorable, OrthoPediatrics Canada recommends the removal of implants in order to avoid bone refracture, particularly in young children and active patients. Those that bone consolidation is complete prior to the removal of the device. Although the final decision to retrieve the implants falls on the surgeon, a maximum Device Lifetime of 5 years for the implant is established to ensure material stability. The Surgical Technique Rescue manual details retrieval steps and should be carefully followed.

General Care, Cleaning, Handling and Inspection

Store implants unopened in their respective protective packages until use. Protect the components from contact with objects, which may damage the surface finish. Avoid undue stress or strain when handling or cleaning. Tap water can contain many minerals that may discolor and stain the parts; therefore, it is recommended that distilled water be used for the final rinse of the implants.

Implant components can be reprocessed by the intended users according to the cleaning and sterilization instructions provided in this document. There is no specific limitation to the number of times an implant can be reprocessed provided the implant component must be visually inspected prior to use and disposed of implants that exhibit surface or configuration damage such as fractures, scratches, cracks, bending, warping, nicking, denting, chipping or evidence of corrosion or discoloration. Any implant component that has been exposed to a human body must be stored and transported in dry conditions.

Cleaning and Sterilization and Re-sterilization for Implant Components and Trays

Implants are provided non-sterile, but with ISO 9626-316SS material, when shipped from OrthoPediatrics Canada. The following instructions should be followed to sterilize non-sterile items or previously sterile items that have been opened but not used. Apply a standard cleaning protocol that is approved by the hospital before implant sterilization. All metallic implants and trays can be steam sterilized following the instructions and parameters listed below:

- Implant components of the Fassier-Duval Telescoping IM System are provided non-sterile for sterilization.
- Implant tray should be sterilized wrapped in two layers of 1-ply polypropylene wrap using sequential wrapping techniques.
- Devices should be thoroughly dry before packaging and sterilization.
- Implant assemblies must be disassembled into separate components prior to sterilization.

Method	Steam (Only for Implant Components)	Steam (Implant Components and Trays)
Sterilization type	Gravity	Prevacuum
Preconditioning pulse	-	3
Minimal temperature	250°F (121°C)	270°F (132°C)
Minimal dry time	30 minutes + 5min	30 minutes
Minimal drying time	30 minutes	30 minutes

Advarsel: Bakker må ikke stables under sterilisation

Andre sterilisasjonsmetoder kan være like effektive, men ikke like egnet. Innholdet tørkes det, at alternative metoder valideres ved hjelp af bestrålingsmåling og laboratorietekniker.

Instructions for reengering, sterilisation og resterilisation af instrumenter

Alle genanvendelige instrumenter skal reengeres og sterilliseres inden hver brug. Instrumentbakken og instrumenterne i Fassier-Duval System skal sterilliseres indpakket i to lag enkeltlags polypropylenfilm under anvendelse af sekventielle indpakningsteknik.

For yderligere instruktioner se den trykte brugervejledning til sterilisation af instrumenter hentes til dokumenter „Guidance for Instrument Care", der er tilgængeligt på vores websted på https://www.pegamedical.com/fm-users.

Opbevaringen og håndtering af implantater

Efter brug er anordningen en potentiel biologisk fare, da den kan være forurenet med blod eller andet væske, hvorfor ikke vær, håndter og behandler produkt i overensstemmelse med gældende hospitalsprocedurer og regler for håndtering af potentielt smitsomme materialer.

Method	Dampf (For Tilt Implantbeholdere)	Dampf (Implantatkomponenter og Sutsbeholdere)
Art der Sterilisation	Schwerkraft	Vorvakuum
Vorbedingungspuls	-	3
Mindestemperatur	121 °C (250 °F)	132 °C (270 °F)
Mindesttrockenzeit	60 Minuten + 5 min	4 Minuten
Mindesttrocknungszeit	30 Minuten	30 Minuten

Achtung: Schalen während der Sterilisation nicht stapeln.

Andere Sterilisationsmethoden können ebenso wirksam sein, aber nicht so geeignet werden. Es wird jedoch empfohlen, alternative Methoden anhand geeigneter Labortechniken zu validieren.

Anleitung zur Reinigung, Sterilisation und Resterilisation der Instrumente

Wiederverwendbare Instrumente sind vor jedem Einsatz gereinigt und sterilisiert werden. Die Instrumententschalen und Instrumente des Fassier-Duval-Systems müssen verpackt in zwei Lagen einlagiger Polypropylenfolie unter Verwendung sequenzieller Verpackungstechniken sterilisiert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Gebrauchsanweisung zum Reinigen und Sterilisieren von Instrumenten", das auf unserer Website unter https://www.pegamedical.com/fm-users verfügbar ist.

Hinweise zur Entsorgung

Nach dem Gebrauch stellt das Produkt eine potenzielle biologische Gefahr dar, da es mit Blut oder anderen Flüssigkeiten, Körnern oder Gewebe kontaminiert sein kann. Behandeln und entsorgen Sie das Produkt gemäß anerkannten medizinischen Praktiken und den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Gesetzen und Vorschriften.

Meldung von Problemen / Hinweis für den Anwender und/oder Patienten

Vorgesehene Anwender und Patienten sollten alle vermuteten unerwünschten Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem implantierten Medizinprodukt melden, indem sie den Hersteller unter medicalcare@pegamedical.com, den örtlichen Vertriebspartner von OrthoPediatrics Canada ULC oder die zuständige Aufsichtsbehörde in dem Land, in dem das vermutete Vorkommnis aufgetreten ist, informieren (siehe unten).

⚠ Fassier-Duval Telescopic IM System – Information zur MRT-Sicherheit

In nicht-klinischen Tests wurde festgestellt, dass die Implantate des „Fassier-Duval Telescopic IM System" MR-tauglich sind. Bei einem Patienten mit diesem Produkt kann unter den folgenden Bedingungen unmittelbar nach der Platzierung des Produkts gefahrlos ein Scan durchgeführt werden:

Statische magnetische Feldstärke (B0)	1,5 T und 3 T
Maximale räumliche Feldgradient	Maximal 20 T/m (2 000 Gauß/cm)
HF-Anregung	Zirkularpolarisiert (CP)
	Körperspule: Siehe Beschränkungen des Scanbereichs unten
HF-Sendespulentyp	Lokale Spulen: Kopfspule mit Sende-/Empfangsfunktion, keine Einschränkungen für lokale Sende-/Empfangsspulen, in denen sich das Produkt nicht befindet
Betriebsart	Normaler Betriebsmodus
Maximale Ganzkörper-SAR	Siehe Details unten
Maximale Kopf-SAR	3,2 W/kg (normaler Betriebsmodus)
Anatomische zusammenstellende Landmarken	< 50 cm von der Mitte des Knochens, in den das Produkt implantiert wird
1,5 T – SAR und Scandauer	1 W/kg durchschnittliche Ganzkörper-SAR bei 10 Minuten kontinuierlicher HF-Bestrahlung (eine Sequenz oder aufeinanderfolgende Serien"Scans ohne Pausen)
	2 W/kg durchschnittliche Ganzkörper-SAR bei 60 Minuten kontinuierlicher HF-Bestrahlung (eine Sequenz oder aufeinanderfolgende Serien"Scans ohne Pausen)
3 T – SAR und Scandauer	
Bildartefakt	Das Vorhandensein dieses Implantats kann zu einem Bildartefakt führen. Um das Vorhandensein dieses Produkts zu kompensieren, kann eine Optimierung der MR-Bildgebungsparameter erforderlich sein.

- Das Vorhandensein anderer Implantate oder der Gesundheitszustand des Patienten können die MR-Bedingungen verändern.
- Weitere Informationen zu einem bestimmten Parameter nicht enthalten sind, bestehen für diesen Parameter keine bekannten Bedingungen.

Sicherheitsvorteile und Leistungsmerkmale

Im Gegensatz zu herkömmlichen Intramedullären (IM)-Stäben tragen die FD-Stäbe dazu bei, Komplikationen wie eine erneute Fraktur und Implantatmigration bei skelettal unreifen Patienten mit Osteogenesis imperfecta (OI) oder anderen Knochenerkrankungen zu reduzieren. Darüber hinaus senken sie den Bedarf an Folgeoperationen und Revisionseingriffen, was zu einer verbesserten Sicherheit und insgesamt besseren Ergebnissen für die Patienten führt.

Die FD-Stäbe verbessern im Vergleich zu herkömmlichen IM-Stäben die Verwindung der Knochen, die Konsolidierung und die Heilungsraten bei skelettal unreifen Patienten mit OI oder anderen Knochenerkrankungen. Weiterhin bewirkt das FD-System Verbesserungen der allgemeinen motorischen Funktionen, des Bewegungsumfangs, der Mobilität, der Schmerz- und Unwohlfühl- sowie Beurteilungsskalen des Pediatric Outcomes Data Collection Instrument (PODCI)-Score. Diese Vorteile führen zu einer schnelleren funktionellen Genesung und besseren Langzeitergebnissen bei pädiatrischen Patienten. Die Leistungsmerkmale der Implantate wurden bestimmt, um sicherzustellen, dass die Produkte ihren vorgesehenen Zweck während ihrer vorgesehenen Lebensdauer erfüllen.

Einzelheiten zum sicheren Nutzen und zu den Leistungsmerkmalen des Produkts finden Sie auch in den Dokumenten „Operationstechnik" und „Kurzfassung der Sicherheit und klinischen Leistung" (SSCP). Detaillierte Informationen zu den Leistungsmerkmalen des Produkts und zu den erwarteten klinischen Ergebnissen finden Sie in dem SSCP. Die dem System zugehörigen Instrumenten sind in erster Linie dazu bestimmt, die richtige Ausrichtung, Größe, Implantation und Explantation des Implantats zu unterstützen.

Den SSCP finden Sie auf unserer Patientenwebsite unter www.pegamedical.com/en/for-patients sowie in der EUDAMED-Datenbank.

Informationen zur Nachsorge

Die Nachsorge ist ein wichtiger Bestandteil des Behandlungsprozesses nachdem eine Implantation mit dem Fassier-Duval Telescoping IM System erfolgt ist. Eine regelmäßige Überwachung ist notwendig, um den Heilungsprozess zu evaluieren, die Reaktion des Patienten auf das Implantat zu bestimmen und eine ordnungsgemäße Ausrichtung des Implantats sicherzustellen. Die Häufigkeit und Dauer der Nachuntersuchungen sollte vom behandelnden Chirurgen unter Berücksichtigung des individuellen Zustands, des Alters und des Heilungsverlaufs des Patienten festgelegt werden.

Bei Nachuntersuchungen sollten die Gesundheitsdienstleister auf potenzielle Komplikationen achten. Es ist wichtig sicherzustellen, dass das Implantat während des Skelettwachstums des Patienten in der richtigen Position verbleibt. Obwohl das System darauf ausgelegt ist, dem Skelettwachstum Rechnung zu tragen und die Bruchstabilität zu gewährleisten, ist eine kontinuierliche Beurteilung unerlässlich, um das Risiko von Komplikationen zu minimieren und die Behandlung bei Bedarf anzupassen.

Die Entscheidung über Zeitpunkt und Umfang der Nachsorge liegt im Ermessen des Chirurgen und basiert auf seinen klinischen Beurteilung und den individuellen Bedürfnissen des Patienten.

Operationstechnik

Die Anleitung der Marknägel wird die Standard-Operationstechnik empfohlen. Präoperative Verfahren, die Kenntnis der anzuwendenden Operationstechniken, eine sorgfältige Patientenauswahl und das richtige Platzieren des Implantats sind für den erfolgreichen Einsatz dieses Produkts gleichermaßen wichtig. Das Handbuch zur Operationstechnik ist auf der Website von OrthoPediatrics Canada ULC verfügbar, gegebenenfalls mit den erforderlichen Übersetzungen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.pegamedical.com/en/for-users.

Lebensdauer und Entfernung

Die Entfernung oder der Ersatz des Implantats wird im Anschluss an die normale Nachsorge empfohlen, nachdem sich der Knochen konsolidiert hat und der Defektionskorrektur erreicht oder eine vollständige Streckung des Fassier-Duval-Systems sowie volle Längenausdehnung erreicht wurde. Durch die routinemäßige Entfernung interner Fixationsvorrichtungen kann das Auftreten von symptomatischen Komplikationen wie Implantatbruch, Implantatlockerung und implantatbedingten Schmerzen gemindert werden. Wenn eine Entfernung sinnvoll ist, empfiehlt OrthoPediatrics Canada außerdem die Entfernung der Implantate, um eine Knochenfraktur, insbesondere bei jungen oder aktiven Knochenwachstum zu vermeiden, insbesondere bei jungen und aktiven Patienten. Stellen Sie vor der Entfernung des Produkts sicher, dass die Knochenkonsolidierung abgeschlossen ist. Obwohl die endgültige Entscheidung über die Entfernung der Implantate in der Verantwortung des Chirurgen liegt, wird eine maximale Lebensdauer des Implantats von 5 Jahren für das Implantat festgesetzt, um die Materialstabilität zu gewährleisten. Das Handbuch zur Operationstechnik enthält eine genaue Beschreibung der einzelnen Entnahmeschritte und muss sorgfältig befolgt werden.

Allgemeine Pflege, Aufbewahrung, Handhabung und Inspektion

Bewahren Sie die Implantate bis zur Verwendung ungeöffnet in der jeweiligen Schutzverpackung auf. Schützen Sie die Komponenten vor dem Kontakt mit Gegenständen, die die Oberfläche beschädigen könnten. Vermeiden Sie bei der Handhabung oder Reinigung übermäßige Belastungen. Leitungswasser kann viele Mineralien enthalten, die die Teile verfärben und flecken hinterlassen können. Daher wird empfohlen, beim abschließenden Spülvorgang der Implantate destilliertes Wasser zu verwenden, um eine Fleckenbildung zu vermeiden.

Implantatkomponenten können von den vorgesehenen Benutzern gemäß den in diesem Dokument enthaltenen Reinigungs- und Sterilisationsanweisungen aufbereitet werden. Es gibt keine spezifische Begrenzung bezüglich der Anzahl der Aufbereitungszyklen, jedoch muss jede aufbereitete Implantatkomponente vor der Verwendung einer Sichtprüfung unterzogen werden. Implantate, die Oberflächen- oder Konfigurationsschäden wie Brüche, Kratzer, Risse, Verformungen, Kerben, Delles, Abplatzungen oder Anzeichen von Korrosion oder Verfärbungen aufweisen, müssen entsorgt werden. Alle Implantatkomponenten, die mit dem menschlichen Körper in Berührung gekommen sind, müssen an einem trockenen Ort gelagert und transportiert werden.

Reinigung und Sterilisation sowie erneute Sterilisation von Implantaten und Tabletts

Alle Implantate werden von OrthoPediatrics Canada in sauberem, aber UNSTERILEM Zustand geliefert. Zum Sterilisieren nicht steriler Gegenstände oder zuvor steriler Gegenstände, die geöffnet, aber nicht verwendet wurden, sollten die folgenden Anweisungen befolgt werden. Wenden Sie vor der Sterilisation des jeweiligen Implantats ein vom Krankenhaus genehmigtes standardisiertes Reinigungsprotokoll an. Alle metallischen Implantate und Tabletts können gemäß den nachstehenden Anweisungen und Parametern dampfsterilisiert werden:

- Implantatkomponenten des Fassier-Duval-Telescoping IM System werden unsteril zur Sterilisation geliefert.
- Implantattablett sollte sterilisiert eingewickelt in zwei Lagen einlagiger Polypropylenfolie unter Verwendung sequenzieller Verpackungstechniken sterilisiert werden.
- Geräte müssen vor dem Verpacken zur Sterilisation gründlich getrocknet werden.
- Zur implantierbaren Baugruppen müssen vor der Sterilisation in separate Komponenten zerlegt werden.

Methode	Dampf (Nur für Implantatkomponenten)	Dampf (Implantatkomponenten und Tabletts)
Art der Sterilisation	Schwerkraft	Vorvakuum
Vorbedingungspuls	-	3
Mindesttemperatur	121 °C (250 °F)	132 °C (270 °F)
Mindesttrockenzeit	60 Minuten + 5 min	4 Minuten
Mindesttrocknungszeit	30 Minuten	30 Minuten

Advarsel: Bakker må ikke stables under sterilisation

Andre sterilisasjonsmetoder kan være like effektive, men ikke like egnet. Innholdet tørkes det, at alternative metoder valideres ved hjelp af bestrålingsmåling og laboratorieteknikker.

Instruktioner for rengøring, sterilisation og resterilisation af instrumenter

Alle genanvendelige instrumenter skal rengøres og steriliseres inden hver brug. Instrumentbakken og instrumenterne i Fassier-Duval System skal sterilliseres indpakket i to lag enkeltlags polypropylenfilm under anvendelse af sekventielle indpakningsteknik.

For yderligere instruktioner se den trykte brugervejledning til sterilisation af instrumenter hentes til dokumenter „Guidance for Instrument Care", der er tilgængeligt på vores websted på https://www.pegamedical.com/fm-users.

Opbevaringen og håndtering af implantater

Efter brug er anordningen en potentiel biologisk fare, da den kan være forurenet med blod eller andet væske, hvorfor ikke vær, håndter og behandler produkt i overensstemmelse med gældende hospitalsprocedurer og regler for håndtering af potentielt smitsomme materialer.

Method	Dampf (For Tilt Implantbeholdere)	Dampf (Implantatkomponenter og Sutsbeholdere)
Sterilisationstype	Tyngdekraft	Prævakuum
Forbehandlingspuls-gulvning	-	3
Temperatur minimi	250°F (121°C)	270°F (132°C)
Gulvtørretid minimi	30 minutter + 5 min	4 Minutter
Tørretid minimi	30 minutter	30 minutter

Advarsel: Bakker må ikke stables under sterilisering

Andre sterilisationsmetoder kan være lige så effektive, men ikke så egnede. Indholdet tørres det, at alternative metoder valideres ved hjælp af bestrålingsmåling og laboratorieteknikker.

Instruktioner for rengøring, sterilisering og resterilisering af instrumenter

Alle genanvendelige instrumenter skal rengøres og steriliseres inden hver brug. Instrumentbakken og instrumenterne i Fassier-Duval System skal steriliseres indpakket i to lag enkeltlags polypropylenfilm under anvendelse af sekventielle indpakningsteknik.

For flere instruktioner, se den trykte brugervejledning til sterilisering af instrumenter henvises til dokumenter „Guidance for Instrument Care", der er tilgængelig på vores websted på https://www.pegamedical.com/fm-users.

Opbevaringen og håndtering af implantater

Efter brug er anordningen potentielt biologisk fare, da den kan være forurenet med blod eller andet væske, hvorfor ikke vær, håndter og behandler produkt i overensstemmelse med gældende hospitalsprocedurer og regler for håndtering af potentielt smitsomme materialer.

Metode	Damp (For Tilt Implantbeholdere)	Damp (Implantatkomponenter og Sutsbeholdere)
Sterilisationstype	Tyngdekraft	Prævakuum
Forbehandlingspuls-gulvning	-	3
Temperatur minimi	250°F (121°C)	270°F (132°C)
Gulvtørretid minimi	30 minutter + 5 min	4 Minutter
Tørretid minimi	30 minutter	30 minutter

Advarsel: Bakker må ikke stables under sterilisering

Andre sterilisationsmetoder kan være lige så effektive, men ikke så egnede. Indholdet tørres det, at alternative metoder valideres ved hjælp af bestrålingsmåling og laboratorieteknikker.

Instruktioner for rengøring, sterilisering og resterilisering af instrumenter

Alle genanvendelige instrumenter skal rengøres og steriliseres inden hver brug. Instrumentbakken og instrumenterne i Fassier-Duval System skal steriliseres indpakket i to lag enkeltlags polypropylenfilm under anvendelse af sekventielle indpakningsteknik.

For flere instruktioner, se den trykte brugervejledning til sterilisering af instrumenter henvises til dokumenter „Guidance for Instrument Care", der er tilgængelig på vores websted på https://www.pegamedical.com/fm-users.

Opbevaringen og håndtering af implantater

Efter brug er anordningen potentielt biologisk fare, da den kan være forurenet med blod eller andet væske, hvorfor ikke vær, håndter og behandler produkt i overensstemmelse med gældende hospitalsprocedurer og regler for håndtering af potentielt smitsomme materialer.

Metode	Damp (For Tilt Implantbeholdere)	Damp (Implantatkomponenter og Sutsbeholdere)
Sterilisationstype	Tyngdekraft	Prævakuum
Forbehandlingspuls-gulvning	-	3
Temperatur minimi	250°F (121°C)	270°F (132°C)
Gulvtørretid minimi	30 minutter + 5 min	4 Minutter
Tørretid minimi	30 minutter	30 minutter

Advarsel: Bakker må ikke stables under sterilisering

Andre sterilisationsmetoder kan være lige så effektive, men ikke så egnede. Indholdet tørres det, at alternative metoder valideres ved hjælp af bestrålingsmåling og laboratorieteknikker.

Instruktioner for rengøring, sterilisation og resterilisation af instrumenter

Alle genanvendelige instrumenter skal rengøres og steriliseres inden hver brug. Instrumentbakken og instrumenterne i Fassier-Duval System skal steriliseres indpakket i to lag enkeltlags polypropylenfilm under anvendelse af sekventielle indpakningsteknik.

For flere instruktioner, se den trykte brugervejledning til sterilisation

Informacni o follow-up

A follow-up kontrolní návštěva je nejdůležitější součástí léčby. Pacient musí být informován o možných komplikacích a příznacích. Je nezbytné, aby pacient byl informován o významu pravidelného sledování a o tom, že v případě jakýchkoli příznaků nebo symptomů by se měl neprodleně obrátit na svého lékaře.

Turpmāka informācija

Uzsākot ārstēšanu ar implantējamo "Fassier-Duval Telescopic IM System" implantējamais ir svarīgs nodrošināt turpmāku apkopi. Pacients regulāri jāuzrauga, lai novērtētu slēgtības procesu un pacienta orgānisma reakciju uz implantēto ierīci pirmstaja. Tālu, lai pārliecinātos, ka pacients ir informēts par iespējamām komplikācijām un to simptomiem. Pacientam ir svarīgi zināt, ka jebkuru simptomu vai komplikāciju gadījumā viņam ir jāsazinās ar savu ārstējošo ārstu.

Informacja o kontroli

Kontrola jest najważniejszą częścią całego procesu leczenia. Pacjent musi być poinformowany o możliwych powikłaniach i objawach. Ważne jest poinformowanie pacjenta o znaczeniu regularnych kontroli i o tym, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów lub symptomów powinien on niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Informácie o kontrole

Kontrola je najdôležitejšou súčasťou celého procesu liečby. Pacient musí byť informovaný o možných komplikáciách a príznakoch. Je nevyhnutné, aby bol pacient informovaný o dôležitosti pravidelných kontrol a o tom, že v prípade akýchkoľvek príznakov alebo symptómov by sa mal bezodkladne obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára.

Informacije o kontroli

Kontrola je najpomembnejši del celotnega postopka zdravljenja. Bolnik mora biti obveščen o možnih zapletih in znakih. Bistveno je, da je bolnik obveščen o pomembnosti rednih kontrol in da se mora v primeru kakršnih koli znakov ali simptomov takoj obrniti na svojega zdravnika.

Informácie o kontrole

Kontrola je najdôležitejšia časť celého procesu liečby. Pacient musí byť informovaný o možných komplikáciách a príznakoch. Je nevyhnutné, aby bol pacient informovaný o dôležitosti pravidelných kontrol a o tom, že v prípade akýchkoľvek príznakov alebo symptómov by sa mal bezodkladne obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára.

Informacije o kontroli

Kontrola je najpomembnejši del celotnega postopka zdravljenja. Bolnik mora biti obveščen o možnih zapletih in znakih. Bistveno je, da je bolnik obveščen o pomembnosti rednih kontrol in da se mora v primeru kakršnih koli znakov ali simptomov takoj obrniti na svojega zdravnika.

Informacje o kontroli

Kontrola jest najważniejszą częścią całego procesu leczenia. Pacjent musi być poinformowany o możliwych powikłaniach i objawach. Ważne jest poinformowanie pacjenta o znaczeniu regularnych kontroli i o tym, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów lub symptomów powinien on niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Informácie o kontrole

Kontrola je najdôležitejšou súčasťou